




献血ダイジョウブ？



献血のご協力をお考えの方に、お薬や予防接種等の基準をご案内いたします。

なお、当日医師の問診により献血をご遠慮いただく場合がありますのでご了承ください。

♥ お薬について

【服薬していても献血可能な薬】

当日の服用でも可（一例）

- ・ 血圧降下剤
- ・ 高脂血症、コレステロールの薬、
- ・ 抗アレルギー薬（一部のステロイド薬を除く）
- ・ 尿酸値降下薬
- ・ 漢方薬
- ・ 低用量ピル

前日の服用まで可（一例）

- ・ 頭痛薬、解熱鎮痛剤（ロキソニン等）
- ・ 市販の風邪薬

その他にも、お薬によっては服用していても大丈夫なお薬が様々あります。

※お薬のお名前が分からないと、ご協力いただけない場合がございます。



♥ 予防接種について

【予防接種後の期間】

・ 新型コロナウイルスワクチン

ファイザー社製・モデルナ社製 mRNA ワクチン……接種後、48 時間後から献血可

アストラゼネカ社製ウィルスベクターワクチン……接種後、6 週間後から献血可

- ・ インフルエンザ、破傷風、狂犬病、日本脳炎、A 型肝炎、肺炎球菌、百日ぜき、等
……接種後、24 時間後から献血可

- ・ B 型肝炎……接種後、2 週間後から献血可

- ・ 風疹、麻疹、おたふくかぜ、B C G、等……接種後、4 週間後から献血可

▼以下に該当する方は、献血をご遠慮いただいております▼

- ◎ 3 日以内に出血を伴う歯科治療を受けた方（歯石除去も含む）
- ◎ 海外から帰国後 4 週間以内の方
- ◎ 過去に輸血（自己血を除く）の経験のある方（ほか）



新型コロナウイルス感染症に関するお願い

《献血前》

以下に該当される方は

「献血」をご遠慮いただいております。

- ◆新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR または抗原検査）で陽性になったことがあり、**症状軽快から**（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）**2週間以内の方**
- ◆発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症が疑われる**症状出現日から2週間以内の方及び症状軽快から3日以内の方**
- ◆同居されている方が新型コロナウイルス感染者に該当し、発症日から**1週間以内の方**

《献血後》

献血にご協力いただいた方へ

以下に当てはまる場合は、献血日、氏名、生年月日を、できるだけ早く血液センターにご連絡をお願いします。

- 献血後2週間以内に
 - ①「新型コロナウイルス感染症」と診断された、または新型コロナウイルス検査(PCR または抗原検査)が陽性になった。
 - ②発熱及び咳・呼吸困難などの呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状があった。
- 献血翌日までに同居されている方が新型コロナウイルス感染者または疑う症状があった。

症状の発生状況等もお聞きすることがあります。

ご連絡をいただいた方のプライバシーは確実に守られますのでご安心ください。

各血液センターお問い合わせの一覧はこちらから
<https://www.jrc.or.jp/about/search/bloodcenter>

